Oslo universitetssykehus

Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Avdeling for medisinsk biokjemi - Rikshospitalet
Seksjon for biokjemisk genetikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Tlf. 23 07 10 48 Faks. 23 07 10 80

SBG03

Vennligst skriv ut skjemaet og send sammen med prøven.

Dato mottatt : Sign.:

TIL BRUK FOR LABORATORIET IKKE SKRIV HER

REKVIRENT	**PASIENT**
Rekvirentnavn: Rekvirentkode/ID: Avd. /sykehus: Adresse: Postnr. /-sted: Telefon/calling:	Fødselsnr. (11 siffer): Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr./-sted: Bostedskommune: *evt. Bostedsland :* *For inneliggende pasienter Rikshospitalet* Avsnitt Rom Seng Innlagt ☐ Poliklinisk ☐ Kvinne ☐ Mann ☐
Kopi til:	

Kliniske opplysninger :	**Prøve :**	
Sammenfatning av sykehistorie/spesielle ønsker: ***Dersom rask analyse ønskes, må behandlende lege kontakte en av avdelingens leger på tlf. 23 07 10 48***	☐ Urin ☐ Heparinplasma ☐ Serum ☐ EDTA-plasma ☐ EDTA-blod ☐ Spinalvæske ☐ Annet	Dato: *d d m m å å* Kl.slett: *t t : m m* Fastende: ☐ Blodsmitte: ☐ Prøvetaker:

Medikamenter/spesiell ernæring:

Kliniske data/laboratoriefunn:

Generelle funn:
- ☐ Vekstretardasjon
- ☐ Mikrocephali
- ☐ Macrocephali
- ☐ Dysmorfe trekk
- ☐ Leversykdom
- ☐ Splenomegali
- ☐ Hudanomalier
- ☐ Øyeanomalier
- ☐ Påfallende lukt
- ☐ Døvhet
- ☐ Gjentatte infeksj.
- ☐ Hyperventilasjon
- ☐ Skjelettanomalier
- ☐ Rakitt

Nevrologiske funn:
- ☐ Mental retardasjon
- ☐ Motorisk retardasjon
- ☐ Hypertoni
- ☐ Hypotoni
- ☐Muskelsvakhet/pareser
- ☐ Nystagmus
- ☐ Ufrivillige bevegelser
- ☐ Epileptogene anfall
- ☐ Letargi/koma
- ☐ Avvikende oppførsel

Gastrointestinale funn:
- ☐ Brekninger
- ☐ Diaré
- ☐ Spisevegring

Nefrologiske funn:
- ☐ Nyrestein

Ernæring:
- ☐ Oral
- ☐ Parenteral

Genetikk:
- ☐ Foreldre beslektet
- ☐ Metabolsk sykd. i familien

Etnisitet……

Laboratoriefunn:
- ☐ Acidose pH……
- ☐ Ketose
  Laktatverdi . . . . . .
- ☐ Hyperglykemi Glukose . .
- ☐ Hypoglykemi Glukose . . .
- ☐ Hyperammonemi NH_3 . . .
- ☐ Anemi Hb . . . . . .
- ☐ Neutropeni
- ☐ Trombocytopeni
- ☐ Koagulasjonsforstyrrelse
- ☐ Vakuoliserte lymfocytter

Prøvetaking : Til generell metabolsk screening trenger vi urin og serum til CDT. Spesifikke problemstillinger kan kreve andre analyser/materialer[2)]

Urin[1)]: Minimum 10 mL urin, helst morgenurin. Ingen tilsetninger.

Serum til CDT og ultralange fettsyrer/fytansyre: 1 mL prøvemateriale.

Plasma fra heparinblod og spinalvæske til aminosyreundersøkelse[1)] : 0,5 - 1 mL prøvemateriale. Heparinblod og spinalvæske sentrifugeres og avpipetteres innen 30 min. Pasienten bør være fastende når blodprøve tas. Når det tas spinalvæske, må det samtidig tas heparinplasma.

Plasma fra EDTA-blod til acylcarnitinundersøkelse[1)] : 0,5 mL prøvemateriale. Plasma avpipetteres innen 30 min.

DNA-analyse: 0,5-1 mL EDTA-blod. Etter avtale med laboratoriet.

Enzymanalyser: Kun etter avtale med laboratoriet.

[1)] **Må fryses umiddelbart, og sendes på tørris til laboratoriet.** [2)] **Se litteratur**

For analyserepertoar se Laboratoriehåndboka

Intranett: Mitt Skrivebord ➢ Enheter ➢ Klinkker ➢ Velg klinikk her ➢ Laboratorieklinikken ➢ Medisinsk biokjemi

Internett: www.rikshospitalet.no ➢ Avd. for med. Biokjemi

Seksjon for biokjemisk genetikk

http://rikshospitalet.no/LAB/rekvisisjon/<mal>.pdf